CULTURA	APLIC. COSTAL	APLIC. TERRESTRE	APLIC. AÉREA
SOJA, FEIJÃO	150 ml/ 20 L de calda no 1º botão floral (R1).	2 L/ha em 80 L de calda no 1º botão floral (R1).	2 L/ha em 30 L de calda no 1º botão floral (R1).
MILHO, SORGO	150 ml/ 20 L de calda na 5ª folha + (TS com Celleron Seeds).	2 L/ha em 80 L de calda na 5ª folha + (TS com Celleron Seeds)	2 L/ha em 30 L de calda na 5ª folha + (TS com Celleron Seeds).
CANA-DE-AÇÚCAR	***	Uma aplicação de 3 L em 200 L de calda nas águas.	Uma aplicação de 3 L em 30 L de calda nas águas.
ALGODÃO	***	03 Aplicações de 1 L/ha em 80 L de calda para materiais de ciclo curto. 04 Aplicações de 1 L/ha para materiais de ciclo longo, sendo a primeira aos 28 dias de emergido.	Igual à terrestre, porém 1 L/ha em 30 L de calda.

HORTALIÇAS	1ª APLICAÇÃO	2ª APLICAÇÃO	3ª APLICAÇÃO
BATATAS: INGLESA, DOCE, CARÁ, GENGIBRE, INHAME	150 ml/20 L de água 20 dias após a emergência das plantas (2 L/ha).	150 ml/20 L de água 20 dias após 1ª aplicação (batata 1ª amontoo).	150 ml/20 L de água (2 L/ha) 20 dias após 2ª aplicação (btata 2ª mini tubérculo).
PIMENTA DO REINO, TOMATE, PIMENTÃO, JILÓ, BERINJELA	100 ml/20 L de água nas mudas, 3 dias antes do transplante.	150 ml/20 L água 15 dias após o transplante (2 L/ha).	150 ml/20 L de água a cada 21 dias até o fim da colheita.
REPOLHO, BRÓCOLIS, NABO, COUVE-FLOR, BETERRABA	100 ml/20 L de água nas mudas, 3 dias antes do transplante.	150 ml/20 L água 15 dias após o transplante (2 L/ha).	150 ml/20 L água 40 dias após o transplante (2 L/ha).
CENOURA, RABANETE, QUIABO, FLORES (PLANTAS SEMEADAS)	100 ml/20 L de água 20 dias após a emergência (2 L/ha).	150 ml/20 L de água 40 dias após a emergência (2 L/ha).	150 ml/20 L de água 60 dias após a emergência (2 L/ha).
CEBOLA, ALHO, FLORES DE BULBOS	100 ml/20 L de água nas mudas, 3 dias antes do transplante (cebola).	150 ml/20 L água 20 dias após o transplante (bulbos).	150 ml/20 L água 40 dias após o transplante (2 L/ha).
CEBOLINHA, COUVE, COENTRO, SALSINHA, AGRIÃO, ESPINAFRE	100 ml/20 L de água 20 dias após a emergência das plantas.	100 ml/20 L água 5 dias após cada corte.	150 ml/20 L de água a cada duas coletas (couve).
ALFACE, MORANGUINHO, RÚCULA, MOSTARDA, SALSÃO	75 ml/20 L de água nas mudas, 3 dias antes do transplante.	100 ml/20 L água 15 dias após o transplante (1,5 L/ha).	100 ml/20 L de água 30 dias após o transplante (repetir até colher).
MELANCIA, ABOBRINHA, MELÃO, PEPINO, ABÓBORA, PRONGOS	150 ml/20 L de água quando a rama atingir 25 cm (2 L/ha).	150 ml/20 L de água 21 dias após a 1ª aplicação (2 L/ha).	150 ml/20 L de água 21 dias após a 2ª aplicação (2 L/ha).
CHUCHU, MARACUJÁ, BUCHA, UVA, KIWI, VAGENS, MANDIOCA	150 ml/20 L de água quando a rama atingir 25 cm (2 L/ha) (mandioca 1ª e 3ª).	150 ml/20 L de água 21 dias após a 1ª aplicação (2 L/ha).	150 ml/20 L de água 21 dias após a 2ª aplicação (repetir a cada 21 dias).

FRUTÍFERAS	1ª APLICAÇÃO	2ª APLICAÇÃO	3ª APLICAÇÃO
POMARES EM FORMAÇÃO E MUDAS EM VIVEIROS	150 ml/20 L de água a cada 30 dias por seis meses.	Após as seis aplicações iniciais, 150 ml/20 L de água a cada 90 dias.	Repetir a aplicação até a primeira florada (seguir programa produção).
LARANJA, LIMÃO, LICHIA, PINHA, ABACATE, ATEMOIA, TANGERINA	150 ml/20 L de água na pré-florada, florada ou pós florada (2 L/ha).	150 ml/20 L água na fase de azeitona ou ping pong (2 L/ha).	150 ml/20 L de água ns fase de terminação dos frutos (2 L/ha).
MAÇÃ, PÊSSEGO, AMEIXA, NECTARINA, PERA, CEREJA	150 ml/20 L de água (2 L/ha) 20 dias após o início da brotação	150 ml/20 L água na fase de azeitona ou ping pong (2 L/ha).	150 ml/20 L de água ns fase de terminação dos frutos (2 L/ha).
COCO, AÇAÍ, PALMEIRA REAL, PALMEIRA PUPUNHA, JUSSARA	150 ml/20 L de água a cada 60 dias por seis meses (implantação).	150 ml/20 L de água 90 dias por seis meses (produção).	150 ml/20 L de água 90 dias por seis meses (produção).
MANGA, CAQUI, GOIABA, FIGO, GRAVIOLA, CACAU, ABACATE	150 ml/20 L de água na pré-florada, florada ou pós florada (2 L/ha).	150 ml/20 L água na fase de azeitona ou ping pong (2 L/ha).	150 ml/20 L de água ns fase de terminação dos frutos (2 L/ha).
MARACUJÁ, MELANCIA, MELÃO, UVA, KIWI, MORNAGO	150 ml/20 L de água quando a rama atingir 25 cm (2 L/ha).	150 ml/20 L de água 21 dias após a 1ª aplicação (2 L/ha).	150 ml/20 L de água repetir a cada 21 dias até o fim da colheita.
CAFÉ, MACADAMIA, GUARANÁ, CAJU, PINHÃO MANSO, MAMONA	150 ml/20 L de água na pré-florada, florada ou pós florada (2 L/ha).	150 ml/20 L de água no chumbinho, repetir na granação (1 L/ha).	Café esqueletado ou debilitado, duas aplicações (1 L/ha) a cada 21 d.
MAMÃO	150 ml/20 L de água a cada 30 dias (implantação).	150 ml/20 L dee água a cada 60 dias (2 L/ha).	150 ml/20 L de água a cada 60 dias durante todo o ciclo (2 L/ha).
ABACAXI	150 ml/20 L de água a cada 60 dias (implantação) (2 L/ha).	150 ml/20 L de água na indução floral (2 L/ha).	150 ml/20 L de água a cada 60 dias após a indução (2 L/ha).
BANANA	Muas: 02 aplicações de 150 ml/20 L de água, intervalo de 60 dias.	1 L/ha em 20 L de água no atomizador costal a cada 2 meses	1 L/ha em 16 L de calda. Aplicação por pulverização aérea a cada 2 meses

* Nas aplicações com equipamento individual de alta vazão usar 1/3 da dose recomendada para pulverizadores costais.

CELLERON
Enzymatic Fertilizers